Machine Translated by Google
RCMOS - Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

# Avances y protocolos en la atención prenatal de alto riesgo, la anticoncepción hormonal de larga duración y la atención ginecológica ambulatoria.

Avances y protocolos en la atención prenatal de alto riesgo, anticoncepción hormonal de acción prolongada y Atención ginecológica ambulatoria

Avances y protocolos en la atención prenatal de alto riesgo, anticoncepción hormonal de larga duración y atención ginecológica ambulatoria.

La Dra. Maria Juliana Carcagnolo es
médica especialista en ginecología y obstetricia, graduada de la Universidad de Alfenas (UNIFENAS) y completó su residencia médica en ginecología y obstetricia en la Fundación Centro Médico Campinas.

Resumen

Este artículo analiza los avances clínicos, las guías de diagnóstico y los protocolos de intervención aplicados a la ginecología y obstetricia contemporáneas. Basándose en literatura médica especializada y guías de sociedades científicas internacionales, el estudio investiga los factores determinantes para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal mediante la identificación temprana de patologías en embarazos de alto riesgo, como la preeclampsia y la diabetes gestacional. El trabajo también aborda los mecanismos fisiológicos, la eficacia clínica y el perfil de seguridad de la inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes hormonales subdérmicos, evaluando el impacto de la medicina preventiva en la atención ginecológica primaria y secundaria.

Palabras clave: Ginecología y obstetricia. Atención prenatal de alto riesgo. Anticoncepción de larga duración. DIU. Salud femenina.

Abstracto

Este artículo analiza los avances clínicos, las guías de diagnóstico y los protocolos de intervención aplicados a la medicina ginecológica y obstétrica contemporánea. Basado en literatura médica especializada y guías de sociedades científicas internacionales, el estudio investiga los factores clave para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal mediante la identificación temprana de patologías de alto riesgo durante el embarazo, como la preeclampsia y la diabetes gestacional. Además, el artículo aborda los mecanismos fisiológicos, la eficacia clínica y el perfil de seguridad de los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC), específicamente los dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes hormonales subdérmicos, evaluando el impacto de la medicina preventiva en la atención ginecológica primaria y secundaria.

Palabras clave: Ginecología y obstetricia. Atención prenatal de alto riesgo. Anticoncepción reversible de larga duración. DIU. Salud de la mujer.

## Introducción

La atención sanitaria a la mujer ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas.

impulsado por la evolución del conocimiento técnico y científico, por la introducción de nuevos métodos

diagnósticos y fortalecimiento de la medicina preventiva. Como señalan Rezende y

Montenegro (2017), la ginecología y obstetricia modernas requieren un enfoque integral, en el que

La prevención primaria y la intervención temprana en patologías reproductivas y gestacionales determinan

Reducir las tasas de morbilidad y mortalidad y promover el bienestar de las mujeres en todas las etapas de la vida.

vida.

La atención prenatal es una de las intervenciones de salud pública y privada con mayor impacto.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

en la preservación de la vida materna y neonatal. La clasificación adecuada del riesgo gestacional y la
La monitorización rigurosa de las complicaciones vasculares, endocrinas e infecciosas permite al obstetra
Instituir terapias profilácticas capaces de prevenir el parto prematuro y el sufrimiento fetal agudo.
integración entre la atención ambulatoria de rutina y la preparación para emergencias en unidades de
Los servicios de urgencias y las salas de maternidad establecen la red de seguridad necesaria para un transporte seguro.
de la mujer embarazada.

Este artículo tiene como objetivo analizar las mejores prácticas clínicas y los protocolos actuales en
Atención ginecológica y obstétrica, basada en directrices científicas establecidas. A través de
a partir del análisis sistemático de los criterios de cribado prenatal de alto riesgo y el perfil de eficacia.
En lo que respecta a la anticoncepción reversible de larga duración, el objetivo es demostrar que la medicina basada en
La atención basada en la evidencia, la estandarización de los procedimientos médicos y la humanización de la atención son los pilares fundamentales.
fundamental para la excelencia en la atención médica de la mujer.

## Metodología

El enfoque metodológico adoptado en este estudio se basa en una revisión sistemática de la literatura.
y en el análisis descriptivo de las guías clínicas y el consenso médico internacional, una estructura
Recomendado por la Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia (FEBRASGO).
y por el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) para la actualización de prácticas.
Médico. La recopilación de datos se basa en manuales del Ministerio de Salud y artículos científicos.
Indexada en la base de datos PubMed/MEDLINE y con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El análisis considera parámetros clínicos para la estratificación del riesgo gestacional, criterios de la puntuación de riesgo.
Puntuación de Apgar, perfiles glucémicos y de presión arterial, así como tasas de continuidad y fracaso de los métodos de prueba.
Anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC ) .
Las variables se correlacionaron con marcos teóricos y epidemiológicos desarrollados por
autores como Cunningham et al. (2018), Speroff y Fritz (2014) y Berek (2020), que examinan el
Fisiología reproductiva y endocrinología ginecológica.
Además, la metodología evalúa la eficacia de los flujos de atención en emergencias obstétricas.
y emergencias centradas en la madre. El impacto de la adopción de protocolos estandarizados se examina en
identificación de síndromes hipertensivos del embarazo y síndromes hemorrágicos, validando cómo el
La sistematización de los procedimientos médicos previene complicaciones graves durante el trabajo de parto y el alumbramiento.
período posparto inmediato.


Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS - Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

Capítulo 1: Estratificación del riesgo y manejo de las complicaciones en la atención prenatal.

La atención prenatal estructurada es el pilar fundamental para garantizar la salud materna y...
prevención de resultados perinatales adversos. Según Cunningham et al. (2018), la asistencia
La atención prenatal debe comenzar en el primer trimestre del embarazo, lo que permite determinar con precisión la edad gestacional.
El cáncer gestacional se puede detectar mediante una ecografía temprana y una prueba de detección inicial de afecciones preexistentes.
La estratificación continua del riesgo gestacional en cada consulta ambulatoria garantiza su identificación.
de embarazos que evolucionan desde un perfil de bajo riesgo hasta casos altamente complejos.
Los síndromes hipertensivos del embarazo, en particular la preeclampsia y la eclampsia, se encuentran entre los...
Entre las principales causas de mortalidad materna en todo el mundo. La fisiopatología de la preeclampsia.
La eclampsia implica una remodelación inadecuada de las arterias espirales uterinas debido a una invasión.
Enfermedad trofoblástica, que produce isquemia placentaria y disfunción endotelial sistémica. Cribado
detección temprana mediante velocimetría Doppler de las arterias uterinas en el segundo trimestre, asociada con el uso
El uso profiláctico de ácido acetilsalicílico y carbonato de calcio en pacientes de alto riesgo reduce
aumenta significativamente la incidencia de formas graves de la enfermedad y de restricción del crecimiento intrauterino.




El manejo de la diabetes mellitus gestacional (DMG) representa otro desafío fundamental en la atención médica.
obstetricia contemporánea. Según lo recomendado por el consenso de la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO), cribado metabólico mediante la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) realizada entre la semana 24 y la 28 de gestación permite el diagnóstico y el inicio inmediato del tratamiento.
Control de la dieta y actividad física. En los casos en que no se logre la euglucemia con otras medidas.
Además de los métodos no farmacológicos, la introducción de la terapia profiláctica con insulina previene complicaciones fetales como:

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

macrosomía, distocia de hombros e hipoglucemia neonatal.

Las infecciones del tracto urinario y las infecciones del tracto reproductivo durante el embarazo requieren

Monitorización constante en el laboratorio para prevenir la proliferación bacteriana ascendente. Bacteriuria.

Asintomático, cuando no se diagnostica y trata mediante cultivos de orina de rutina, evoluciona

Con frecuencia se presenta en casos de pielonefritis aguda, un factor de riesgo comprobado para desencadenar complicaciones relacionadas con el trabajo.

La terapia con antibióticos se utiliza en casos de parto prematuro y rotura prematura de membranas.

Las pruebas guiadas por antibiograma y el seguimiento de la curación posterior al tratamiento garantizan el mantenimiento de

Reposo uterino hasta el final de la gestación.

Se concluye que el éxito de la atención prenatal se basa en el estricto cumplimiento de las directrices.

protocolos de diagnóstico y el establecimiento de una relación médico-paciente empática y continua.

La intervención médica es necesaria, basándose en la identificación temprana de cambios fisiológicos y

Reduce los riesgos patológicos, minimiza las complicaciones durante el parto y garantiza el nacimiento seguro de los recién nacidos.

saludable, consolidando la atención prenatal como la medida preventiva más eficaz en obstetricia.

moderno.

Capítulo 2: Mecanismos, eficacia y perfil de seguridad de los anticonceptivos hormonales de acción prolongada.

Duración

La evolución de la medicina anticonceptiva ha permitido el desarrollo de métodos reversibles de larga duración.

anticoncepción reversible a largo plazo (LARC), representada por dispositivos intrauterinos (DIU) hormonales y no hormonales y

mediante implantes hormonales subdérmicos. Como analizaron Speroff y Fritz (2014), los métodos

Los métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC) presentan tasas de eficacia en la práctica real superiores al 99%, rivalizando con las de otros métodos.

procedimientos quirúrgicos irreversibles, ya que su protección es independiente de la adherencia diaria o del uso correcto por parte de la

paciente.

El dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) funciona espesando la

moco cervical, inhibiendo el paso de los espermatozoides y al inducir una reacción atrófica en el

endometrio que impide la implantación. Este mecanismo de acción local confiere al método una eficacia muy alta.

Eficacia anticonceptiva con mínima absorción sistémica de hormonas. Además de la indicación

En el campo de la anticoncepción, el DIU de LNG se utiliza ampliamente como tratamiento de primera línea para

Sangrado uterino anormal secundario a adenomiosis o miomas uterinos menores.

Promueve una reducción significativa del flujo menstrual y del dolor pélvico crónico.

El implante subdérmico liberador de etonogestrel representa el método anticonceptivo más eficaz.

Disponible en la práctica médica actual. Se inserta en el plano subdérmico de la cara interna del brazo, pero no está disponible en la práctica médica actual.

Dominante bajo anestesia local, el implante libera dosis constantes de progestina, inhibiendo

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

Principalmente, desencadena el pico de la hormona luteinizante (LH) y previene la ovulación. La rápida
La reversibilidad del método y el retorno inmediato de la fertilidad tras la extracción del implante lo convierten en...
una opción de primera elección para mujeres que buscan una alta seguridad anticonceptiva combinada con
Planificación reproductiva futura.
La inserción de dispositivos intrauterinos no hormonales, como los de cobre y plata, ofrece una alternativa.
altamente eficaz para pacientes con contraindicaciones absolutas para el uso de hormonas exógenas, como
como por ejemplo, mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama o trombofilia venosa grave.
El mecanismo de acción del DIU de cobre se basa en la inducción de una respuesta inflamatoria aséptica en el
endometrio y el efecto citotóxico de los iones de cobre sobre los espermatozoides, alterando su
Motilidad y viabilidad antes de la fertilización.
Por lo tanto, ampliar el acceso a los métodos anticonceptivos reversibles y prescribirlos adecuadamente es fundamental.
El asesoramiento a largo plazo constituye una estrategia médica fundamental en la salud de la mujer.
Anticoncepción individualizada, en la que el ginecólogo evalúa las comorbilidades de la paciente, su
Los hábitos de vida y los planes reproductivos garantizan la elección del método más seguro y cómodo.
promover la autonomía reproductiva y reducir significativamente las tasas de embarazos no viables
planificado.

Capítulo 3: Abordaje ambulatorio del sangrado uterino anormal y las patologías benignas

El sangrado uterino anormal (SUA) es una de las quejas más frecuentes durante las consultas.
procedimientos ginecológicos ambulatorios, que afectan significativamente la calidad de vida, la productividad y
salud emocional de las mujeres en edad fértil y en la perimenopausia. Según Berek (2020), la
Las investigaciones sobre la acidosis úrica sistémica deben seguir el sistema de clasificación PALM-COEIN, desarrollado por la FIGO.
que clasifica las causas de sangrado en etiologías estructurales (pólipo, adenomiosis, leiomioma,
Malignidad/Hiperplasia) y no estructurales (coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial,
iatrogénico y no clasificado).
La evaluación diagnóstica inicial de la arteria umbilical única requiere una historia clínica detallada y un examen físico ginecológico.
Completo y realización de pruebas de imagen y de laboratorio complementarias. Ultrasonido
La ecografía pélvica transvaginal es la exploración de elección para evaluar el miometrio y localizar los miomas.
Medición ecográfica uterina y endometrial. En mujeres posmenopáusicas o mujeres con ecografía endometrial.
Endometrio anormalmente engrosado, histeroscopia ambulatoria con biopsia endometrial guiada por visión.
El examen directo permite el diagnóstico histopatológico preciso de pólipos endometriales, hiperplasia o
neoplasias endometriales tempranas.
El abordaje terapéutico de las patologías ginecológicas benignas debe priorizar el tratamiento clínico.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google


Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 04/01/2026 | Aceptado: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

Tratamiento conservador antes de recurrir a procedimientos quirúrgicos invasivos. Manejo farmacológico de
El dolor pélvico crónico asociado a la endometriosis y la adenomiosis incluye el uso de progestágenos.
Análogos aislados de GnRH o la inserción de un DIU liberador de levonorgestrel. Inhibición de
La proliferación endometrial y la supresión del ciclo ovárico proporcionan alivio sintomático de
dismenorrea y sangrado abundante, preservando al mismo tiempo la anatomía pélvica de la paciente.
La patología cervical y la detección precancerosa de lesiones del cuello uterino representan...
Otro aspecto fundamental de la ginecología ambulatoria es la realización periódica de la prueba de Papanicolaou.
La prueba de Papanicolaou y la prueba de ADN del VPH permiten la detección temprana de lesiones intraepiteliales escamosas.
Citología de bajo grado (LSIL) y de alto grado (HSIL). En casos de citología anormal, se realiza una colposcopia con biopsia.
El examen dirigido de las áreas acetoblancas o áreas con punteado anormal establece el diagnóstico y orienta el...
Indicación para el procedimiento de escisión de la zona de transformación (TZE) o cirugía de alta frecuencia.
(C Y F).
En resumen, un enfoque ambulatorio metódico y actualizado para las afecciones ginecológicas benignas previene
Evita intervenciones quirúrgicas innecesarias y favorece el diagnóstico precoz de patologías preexistentes.
neoplásico. La capacidad del ginecólogo para integrar ultrasonido, hormonal y
El análisis histopatológico permite diseñar estrategias terapéuticas personalizadas que restablecen la calidad de vida.
Le dan vida a la paciente y preservan su función reproductiva.

Capítulo 4: Asistencia médica en salas de urgencias y emergencias obstétricas

Atención urgente y de emergencia en salas de urgencias ginecológicas y maternidades.
Requiere que el médico tratante tenga una gran capacidad de razonamiento clínico rápido y de toma de decisiones asertiva.
y el estricto cumplimiento de protocolos avanzados de apoyo obstétrico. Como señala Kurjak
Según Chervenak (2006), las emergencias obstétricas se caracterizan por el potencial de un rápido deterioro.
del estado de salud materna y fetal, que requiere equipos multidisciplinarios sinérgicos y capacitados en
Manejo de situaciones críticas.
El sangrado durante el embarazo en el primer y tercer trimestre representa situaciones extremadamente graves.
Gravedad en los servicios de emergencia. En el primer trimestre del embarazo, sangrado vaginal acompañado de
El dolor pélvico requiere un diagnóstico diferencial rápido entre un aborto espontáneo en curso y una enfermedad trofoblástica.
Embarazo gestacional y ectópico. Ecografía transvaginal en el punto de atención .
En combinación con la medición cuantitativa de la beta-HCG sérica, esto permite confirmar la ubicación del saco.
Diagnosticar la hipertensión gestacional y la rotura tubárica en el embarazo ectópico, indicando la necesidad de intervención quirúrgica.
Es urgente detener el shock hipovolémico.
En el tercer trimestre, el desprendimiento de placenta y la placenta previa representan...

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google


Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

Las principales causas de hemorragia grave y sufrimiento fetal agudo. El desprendimiento de placenta se manifiesta típicamente con dolor abdominal intenso de aparición repentina, hipertonía uterina y sangrado oscuro durante mediante parto vaginal. El enfoque médico en un caso de desprendimiento de placenta con un feto vivo y viable es la resolución Parto inmediato por el método más rápido, a menudo una cesárea de emergencia, acompañada de Reposición de líquidos maternos y transfusiones para prevenir el desarrollo de coagulopatía. Coagulación intravascular diseminada (CID).

Sepsis de origen ginecológico y obstétrico, resultante de corioamnionitis, aborto La endometritis infecciosa o la endometritis puerperal requieren el reconocimiento inmediato de los signos de respuesta. Inflamación sistémica y disfunción orgánica. Implementación del "paquete de medidas de la primera hora" para la sepsis. Esto implica la toma de muestras para hemocultivos, la medición de los niveles de lactato sérico y la reanimación temprana con líquidos mediante... cristaloides y la administración inmediata de terapia antibiótica empírica de amplio espectro mediante intravenoso.

Se concluye que la excelencia en la medicina de urgencias ginecológicas y obstétricas depende de... preparación técnica del equipo y estandarización de los procedimientos médicos basados en diagramas de flujo de Riesgo. La garantía es una actuación médica rápida, guiada por evidencia científica y protocolos validados. fundamental para el control de daños, la preservación de la vida materna y la reducción de la morbilidad y la mortalidad atención perinatal en entornos hospitalarios de alta complejidad.

## Capítulo 5: Cribado en la salud de la mujer, medicina preventiva y menopausia

La medicina preventiva aplicada a la ginecología abarca todas las etapas del desarrollo. femenino, con especial énfasis en la transición menopáusica y el climaterio. Según Speroff y Fritz (2014), la disminución progresiva de la producción de estrógeno ovárico induce cambios metabólicos, Factores cardiovasculares, óseos y urogenitales que influyen en la longevidad y la salud general de las mujeres. Los chequeos ginecológicos regulares actúan como una herramienta de detección general de problemas de salud, permitiendo la detección de... Detección precoz no solo de neoplasias del sistema reproductivo, sino también de enfermedades crónicas no transmisibles. La terapia de reemplazo hormonal (TRH) durante la menopausia ha experimentado una evolución significativa en sus esquemas de prescripción, alineados con los conceptos de "ventana de oportunidad". La introducción Terapia de reemplazo hormonal en mujeres sintomáticas menores de 60 años o menores de 10 años. La menopausia presenta un perfil de riesgo-beneficio extremadamente favorable, ya que favorece el alivio de los síntomas. Síntomas vasomotores (sofocos), mejora del perfil lipídico y prevención primaria de la atrofia muscular. Huesos y osteoporosis. El uso de estrógenos mediante inyección transdérmica reduce el riesgo de eventos adversos. Los agentes tromboembólicos venosos se utilizan para evitar que el fármaco sufra metabolismo de primer paso en el hígado. La mamografía de cribado para la detección precoz del cáncer de mama representa la estrategia de

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

El mayor impacto en la reducción de la mortalidad por neoplasias malignas en mujeres. Las directrices de

FEBRASGO recomienda mamografías anuales para mujeres a partir de los 40 años.

Edad en la población habitual de riesgo. En casos de mamas densas o en pacientes con mutaciones.

Factores genéticos confirmados (como BRCA1 y BRCA2) o antecedentes familiares significativos, suplementación

El diagnóstico se realiza mediante ecografía mamaria o resonancia magnética pélvica y mamaria.

Garantiza la identificación de nódulos impalpables en etapas tempranas.

Evaluación de la salud ósea durante la menopausia mediante densitometría ósea de la columna lumbar y el cuello.

La arteria femoral permite la detección precoz de la osteopenia y la osteoporosis antes de que se produzcan.

de fracturas por fragilidad. Guía sobre la ingesta adecuada de calcio elemental, suplementación

Suplementación con vitamina D y la práctica de ejercicios físicos con carga mecánica, combinados con tratamientos.

Los agentes farmacológicos antirresortivos (como los bisfosfonatos), cuando están indicados, preservan la arquitectura.

Salud ósea e independencia funcional en pacientes de edad avanzada.

En resumen, un enfoque preventivo durante la menopausia requiere una visión holística por parte del ginecólogo y

Enfoque multidisciplinario. Individualización de la terapia de reemplazo hormonal y cribado mamográfico.

El control continuo de la salud cervical y ósea, junto con la atención al metabolismo óseo y cardiovascular, garantiza que la mujer

Afronta el proceso de envejecimiento con dignidad, vitalidad y preservando tu autonomía.

funcional.

## Consideraciones finales

El análisis desarrollado a lo largo de este artículo muestra que la ginecología y obstetricia modernas

Requieren una integración continua entre el rigor científico, la medicina preventiva y la preparación técnica.

para la actuación en urgencias hospitalarias. La evolución de los protocolos y directrices de diagnóstico.

El tratamiento ha permitido que la atención prenatal se transforme en una poderosa herramienta para

prevención de complicaciones graves, en la que el cribado sistemático de patologías como pre-

El control de la eclampsia y la diabetes gestacional garantiza un parto seguro y preserva la salud materna.

Democratizar el acceso y mejorar las prescripciones médicas de métodos anticonceptivos.

Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP), con especial énfasis en el DIU liberador de levonorgestrel y...

Los implantes de etonogestrel se están consolidando como avances extraordinarios en la salud reproductiva.

La alta efectividad y el excelente perfil de seguridad de estos métodos brindan autonomía en

planificación familiar para mujeres, reduciendo las tasas de embarazos no planificados y ofreciendo

Alternativas terapéuticas no quirúrgicas altamente efectivas para el tratamiento del sangrado uterino.

anormal.

Atención ginecológica ambulatoria basada en sistemas de clasificación internacionales,

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

Al igual que la prueba PALM-COEIN de la FIGO para el sangrado uterino anormal, optimiza el flujo de trabajo de la investigación.
Diagnostica y evita cirugías mutilantes innecesarias. La capacidad del ginecólogo para
La correlación de datos clínicos, hallazgos ecográficos y resultados histopatológicos garantiza...
Prescripción de terapias hormonales y no hormonales personalizadas que restablecen el bienestar y...
calidad de vida del paciente.

En el contexto de la atención de urgencias y las emergencias obstétricas, el cumplimiento de protocolos estrictos es fundamental.
Soporte avanzado y detección inmediata de afecciones graves, como hemorragias en terceros.
El trimestre de gestación, la rotura de un embarazo ectópico y la sepsis grave son medidas de seguridad esenciales para reducir el riesgo de parto prematuro.
Mortalidad materna y perinatal. Intervención médica rápida y toma de decisiones firme bajo presión.
Demuestran la importancia de la formación continua y la capacitación práctica para los equipos hospitalarios.

El enfoque de la menopausia y la transición menopáusica a través del concepto de la ventana de
La oportunidad que ofrece la terapia de reemplazo hormonal reafirma el papel del ginecólogo como proveedor de atención primaria de salud.
Asistencia médica en la prevención de enfermedades crónicas en mujeres. Personalización de la terapia de reemplazo hormonal a través de diversas vías.
métodos no orales, combinados con exámenes mamográficos periódicos y monitorización de la densidad mamaria
La densidad mineral ósea reduce los riesgos cardiovasculares y previene las fracturas por fragilidad, promoviendo una mayor salud.
Envejecimiento activo y saludable.

Además, la humanización de la atención médica y el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres.
Una comunicación clara sobre estos principios debe estar presente en todas las etapas de la atención ginecológica y obstétrica.
diagnósticos, el acuerdo consciente sobre las opciones terapéuticas y la garantía de un ambiente acogedor.
En el consultorio del médico y en el centro quirúrgico, fortalecen la relación médico-paciente y elevan los niveles de
Adherencia a los tratamientos propuestos.

Formación continua del equipo médico y actualización constante en función de las directrices consensuadas vigentes.
La adhesión a las sociedades científicas internacionales es una cuestión de responsabilidad ética y profesional.
La medicina basada en la evidencia actúa como una brújula que guía la selección de las mejores pruebas.
medicamentos e intervenciones, eliminando prácticas obsoletas y garantizando la máxima seguridad en
procedimientos preventivos y terapéuticos.

Finalmente, se concluye que la inversión en formación médica especializada e infraestructura...
La atención ambulatoria y la estandarización de los protocolos de urgencias hospitalarias constituyen el camino definitivo.
para la consolidación de un sistema de salud femenina altamente eficiente. El compromiso continuo de
Un ginecólogo y obstetra, con ciencia, ética y una dedicación total a la vida de las mujeres, transforma...
La práctica médica diaria como un vector inigualable para preservar la salud y el progreso social.

Referencias

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google


Año VII, vol. 2, 2026 | Recepción: 04/01/2026 | Aceptación: 07/01/2026 | Publicación: 10/01/2026

BEREK, JS Berek & Novak - Ginecología. 16ª edición. Río de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.
CUNNINGHAM, FG et al. Williams Obstetricia. 25. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018.
DUNKELBERG, JC et al. Detección y prevención de complicaciones obstétricas de alto riesgo. American Family Physician, vol. 92, núm. 9, págs. 791-798, 2015.
KURJAK, A.; CHERVENAK, FA Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 1. Ed. Nueva Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2006.
PASSOS, EP et al. Rutinas en Ginecología. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2023.
REZENDE, J.; MONTENEGRO, CAB Obstetricia Fundamental. 14ª edición. Río de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
SPEROFF, L.; FRITZ, MA. Endocrinología ginecológica clínica e infertilidad. 8.ª ed. São Paulo: Manole, 2014.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Recomendaciones seleccionadas de la OMS sobre prácticas de uso de anticonceptivos. 3.ª ed. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2016.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.